



La femelle adulte de *Neohirasea maerens* porte des épines thoraciques nombreuses dont il faut se méfier lors des manipulations -  
Cliché G. Blondeau - OPIE

Par Emmanuel Delfosse

## Le Phasme épineux du Vietnam

### *Neohirasea maerens* (BRUNNER, 1907) (Phasmatoptère, Hétéronémiidé)

#### ■ UNE ESPÈCE DÉLICATE À CERNER

Cette espèce asiatique est relativement peu connue en France. Dans la bibliographie française, elle est citée du Vietnam.

C'est en 1996 qu'elle semble arriver dans les élevages français en provenance du Vietnam, Il semblerait cependant qu'elle soit déjà présente en Europe à cette époque dans les élevages anglais sous le nom de *Menexenus maerens* Brunner, 1907 lequel, avec *Menexenus modificatus* Brunner, 1907, est un des rares synonymes.


#### ■ L'INCUBATION

En élevage, l'œuf est libéré par la femelle dans le feuillage et tombe sur le sol où son incubation prendra de 3 à 5 mois dans des condi-

tions d'humidité de 80 à 90% et une température de 22 à 23°C. Il est ovoïde, de couleur beige-marron avec des mouchetures brunes et mesure près de 2,5 mm de



Les œufs tombent librement sur le sol. Très mimétiques, on les y distingue mal  
Cliché G. Blondeau - OPIE



Femelle adulte de *Neohirasea maerens*  
(Cliché R. Coutin - OPIE)

long et 2 mm de large. Son opercule est brun, surmonté d'un micropyle ocre.

#### ■ UNE ESPÈCE PLUTÔT POLYPHAGE

*Neohirasea maerens* est assez polyphage : ronces, framboisier, rosier, buisson ardent, pommier, noisetier, hêtre, chêne, millepertuis, mûrier noir, hibiscus, eucalyptus, avo-